

# Lösungen zu den Aufgaben zu Geraden und Parabeln

Aufgabe	Rechnung
<p>1. Berechne den Schnittpunkt zwischen f(x) und g(x)!</p> <p>a. <math>f(x) = x^2 + 4x + 3</math>                      <math>g(x) = 6x + 18</math>  b. <math>f(x) = x^2 - 6x + 6</math>                      <math>g(x) = 2x - 1</math>  c. <math>f(x) = 2x^2 + 8x - 80</math>                      <math>g(x) = 4x - 10</math>  d. <math>f(x) = -2x^2 - 38x - 180</math>                      <math>g(x) = 2x + 20</math>  e. <math>f(x) = 4x^2 + 12x - 30</math>                      <math>g(x) = -4x + 54</math>  f. <math>f(x) = 3x^2 - 10x + 30</math>                      <math>g(x) = 2x - 3</math>  g. <math>f(x) = -x^2 - 50x - 200</math>                      <math>g(x) = -24x - 56</math>  h. <math>f(x) = 10x^2 + 50x + 200</math>                      <math>g(x) = x + 10</math></p>	<p>a. <math>x^2 + 4x + 3 = 6x + 18 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 15 = 0</math>  <math>\Leftrightarrow x_{1,2} = -\frac{-2}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{2}{2}\right)^2 - (-15)} = 1 \pm \sqrt{16} = 1 \pm 4 \Rightarrow x_1 = 5 \vee x_2 = -3</math>  <math>g(5) = 48</math> und <math>g(-3) = 0</math>                      <b><math>S_1(5/48)</math> und <math>S_2(-3/0)</math></b></p>
	<p>b. <math>x^2 - 6x + 6 = 2x - 1 \Leftrightarrow x^2 - 8x + 7 = 0</math>  <math>\Leftrightarrow x_{1,2} = -\frac{-8}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{8}{2}\right)^2 - 7} = 4 \pm \sqrt{9} = 4 \pm 3 \Rightarrow x_1 = 7 \vee x_2 = 1</math>  <math>g(7) = 13</math> und <math>g(1) = 1</math>                      <b><math>S_1(7/13)</math> und <math>S_2(1/1)</math></b></p>
	<p>c. <math>2x^2 + 8x - 80 = 4x - 10 \Leftrightarrow 2x^2 + 4x - 70 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 35 = 0</math>  <math>\Leftrightarrow x_{1,2} = -\frac{2}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{2}{2}\right)^2 - (-35)} = -1 \pm \sqrt{36} = -1 \pm 6 \Rightarrow x_1 = 5 \vee x_2 = -7</math>  <math>g(5) = 10</math> und <math>g(-7) = -38</math>                      <b><math>S_1(5/10)</math> und <math>S_2(-7/-38)</math></b></p>
	<p>d. <math>-2x^2 - 38x - 180 = 2x + 20 \Leftrightarrow -2x^2 - 40x - 200 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 20x + 100 = 0</math>  <math>\Leftrightarrow x_{1,2} = -\frac{20}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{20}{2}\right)^2 - 100} = -10 \pm \sqrt{0} \Rightarrow x = -10</math>  <math>g(-10) = 0</math>                      <b><math>S(-10/0)</math></b></p>
	<p>e. <math>4x^2 + 12x - 30 = -4x + 54 \Leftrightarrow 4x^2 + 16x - 84 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 4x - 21 = 0</math>  <math>\Leftrightarrow x_{1,2} = -\frac{4}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{4}{2}\right)^2 - (-21)} = -2 \pm \sqrt{25} = -2 \pm 5 \Rightarrow x_1 = 3 \vee x_2 = -7</math>  <math>g(3) = 42</math> und <math>g(-7) = 82</math>                      <b><math>S_1(3/42)</math> und <math>S_2(-7/82)</math></b></p>

$$f. \quad 3x^2 - 10x + 30 = 2x - 3 \Leftrightarrow 3x^2 - 12x + 33 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 11 = 0$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = -\frac{-4}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{4}{2}\right)^2 - 11} = 2 \pm \sqrt{-7} \text{ geht nicht} \quad \text{kein Schnittpunkt}$$

$$g. \quad -x^2 - 50x - 200 = -24x - 56 \Leftrightarrow -x^2 - 26x - 144 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 26x + 144 = 0$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = -\frac{26}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{26}{2}\right)^2 - 144} = -13 \pm \sqrt{25} = -13 \pm 5 \Rightarrow x_1 = -8 \vee x_2 = -18$$

$$g(-8) = 136 \text{ und } g(-18) = 376 \quad S_1(-8/136) \text{ und } S_2(-18/376)$$

$$h. \quad 10x^2 + 50x + 200 = 10x + 10 \Leftrightarrow 10x^2 + 40x + 190 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 4x + 19 = 0$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = -\frac{4}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{4}{2}\right)^2 - 19} = -2 \pm \sqrt{-15} \text{ geht nicht} \quad \text{kein Schnittpunkt}$$

2. Gegeben sind  $f(x) = x^2 + 20x + 7$  und  $g(x) = 10x + a$

a. Berechnen Sie die Zahl  $a \in \mathbb{R}$  so, dass sich Gerade und Parabel nur in  $x_0 = -5$  schneiden!

b. Berechnen Sie die Zahl  $a \in \mathbb{R}$  so, dass sich Gerade und Parabel in  $x_1 = -12$  und  $x_2 = 2$  schneiden!

c. Für welche  $a$  gibt es keinen Schnittpunkt?

$$a. \quad x^2 + 20x + 7 = 10x + a \Leftrightarrow x^2 + 10x + 7 - a = 0 \Leftrightarrow x_{1,2} = -\frac{10}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{10}{2}\right)^2 - (7 - a)}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = -5 \pm \sqrt{25 - (7 - a)} = -5 \pm \sqrt{18 + a}$$


$$-5 \pm \sqrt{18 + a} = -5 \Leftrightarrow \sqrt{18 + a} = 0 \Leftrightarrow a = -18$$

$$b. \quad -5 - \sqrt{18 + a} = -12 \Rightarrow \sqrt{18 + a} = 7 \Leftrightarrow 18 + a = 49 \Leftrightarrow a = 31$$

$$(-5 + \sqrt{18 + a} = 2 \text{ als Alternative})$$

c. Wenn man die Wurzel  $\sqrt{18 + a}$  nicht ziehen kann, d.h. für  $a < -18$

3. Ein Junge steht auf der Position A (0/0) und schmeißt einen Ball auf eine Rampe. Die Flugbahn soll durch die Funktion  $f(x) = -0,25 \cdot (x - 4)^2 + 5,75$  simuliert werden. Die (gerade) Rampe verläuft durch die Punkte P(0/0) und Q(12/6). Alle Angaben in Metern. In welcher Höhe trifft der Ball die Rampe?



Aufstellung der Geraden:  $m = \frac{6-0}{12-0} = 0,5$ ;  $b = 0 \Rightarrow g(x) = 0,5x$

$$-0,25 \cdot (x - 4)^2 + 5,75 = 0,5x \quad / \cdot (-4)$$

$$\Leftrightarrow (x - 4)^2 - 23 = -2x$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 8x + 16 - 23 = -2x \quad / +2x$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 6x - 7 = 0$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = -\frac{-6}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{6}{2}\right)^2 - (-7)} = 3 \pm \sqrt{16} = 3 \pm 4 \Rightarrow x_1 = 7 \vee x_2 = -1$$

$$f(7) = 3,5$$

**Nach 7 Metern trifft der Ball die Rampe. Die Höhe beträgt 3,5 Meter.**